

BLOCS

BLOX



SOLID • SOLIDE

**KILLS RATS & MICE
TUE RATS ET SOURIS**

*Kills Norway Rats, Roof Rats and House Mice
Tue le rat surmulot, le rat noir et la souris commune*

FASTRAC[®]

**WATER-RESISTANT BLOX RODENTICIDE
RODENTICIDE EN BLOCS RÉSISTANT À L'EAU**

NET CONTENTS: CONTENU NET:
1.92 kg 1,92 kg

REGISTRATION NO.: 27364 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
N° D'HOMOLOGATION: LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

COMMERCIAL

WARNING POISON  AVERTISSEMENT POISON

READ THE LABEL BEFORE USING (see back panels for additional precautionary statements)
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI (pour détails supplémentaires sur la sécurité, voir verso)
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

INDOOR USE ONLY
POUR UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT

**Kills Norway Rats, Roof Rats & House Mice
Tue le rat surmulot, le rat noir et la souris commune**

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, PETS, LIVESTOCK AND WILDLIFE. All handlers must wear long-sleeved shirt and long pants, shoes plus socks, and chemical resistant gloves when handling this product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, PETS AND LIVESTOCK. May be harmful or fatal if swallowed or absorbed through the skin. Chemical resistant gloves must be worn while handling product and when disposing of dead rodents, unopened bait and empty containers. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wash skin thoroughly with soap and water after handling. Wash contaminated clothing separately from other laundry; with soap and hot water before reuse. **KEEP AWAY FROM FEED AND FOODSTUFFS.**


FIRST AID: If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. For all cases of human ingestion, immediately notify a physician or poison control centre. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If pet or livestock poisoning is suspected, immediately contact a veterinarian. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Fastrac Water-Resistant Blix Rodenticide is not an anticoagulant type of rodenticide. If ingested, limit absorption by either emesis or gastric lavage. Sublethal symptoms, if present, would be the result of cerebral edema and should be treated accordingly through administration of an osmotic diuretic and corticosteroid.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish, birds and wildlife. Keep out of lakes, rivers, streams or ponds.

DIRECTIONS FOR USE: Use bait to control the Norway rat (*Rattus norvegicus*), Roof rat (*Rattus rattus*), and House mouse (*Mus musculus*) indoors only. This product is not to be used outdoors or in areas near farm wells or water reservoirs or in areas where there is a possibility of contaminating sources of drinking water.

Food Processing, Food Manufacturing, Food Storage and Food Service Areas: For areas not directly related to food processing. Use only in non-food or non-feed area where feed, food, packaging and handling equipment are never opened or exposed. For areas where feed or food is processed, served, or stored. In meat and food processing plants (processing areas), use only when plant is not in operation. Remove or cover all food, packaging material and utensils before placing bait in baiting stations. Remove all baits and dead rodents before reuse of the plant (processing areas include storage and service). Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash skin thoroughly and put on clean clothing.



6029E-2 Product Code: 5025

USE LIMITATIONS: Bait MUST be placed either in tamper-resistant bait stations or in locations not accessible to children, pets, livestock or non-target wildlife. DO NOT place bait in areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in direct contact with food.

Bait stations (**tier 3**) used for the placement of rodenticide bait indoors, in locations not accessible to pets or livestock must have the following characteristics: (1) be constructed of high-strength material (e.g., metal or injection molded plastic) and resistant to destruction by children; (2) have an entrance designed so that children cannot reach the bait; (3) have internal structure which prevents bait from being shaken loose; (4) have an access panel that fastens securely and locks (e.g., metal screw or padlock); and (5) bear the product name, active ingredient, guarantee, registration number, "WARNING POISON", and the skull and crossbones symbol.

Bait stations (**tier 2**) used for the placement of rodenticide bait indoors, in locations accessible to pets or livestock must have the following characteristics, in addition to those outlined above for tier 3 bait stations: (1) resistant to destruction by non-target animals; and (2) have an entrance designed so that non-target animals cannot reach bait.

SELECTION OF TREATMENT AREAS: Determine areas where rats and/or mice will most likely find and consume the bait. Generally, these areas are along walls, by grained openings, in or beside burrows, in corners and concealed places, between floors and walls, or in locations where rodents or their signs have been observed. Remove as much food as possible.

APPLICATION DIRECTIONS:
NORWAY AND ROOF RATS: Apply 2 to 12 pieces of Fastrac Water-Resistant Blix Rodenticide per placement at intervals of 6 to 10 metres. Adjust the amount of bait applied to the level of rat feeding expected at each bait placement.

HOUSE MICE: Apply 1 piece of Fastrac Water-Resistant Blix Rodenticide per placement. Space placements at intervals of 2 to 4 metres in infested areas. Two pieces may be used at points of extremely high mouse activity.

BAITING STRATEGY: Highest bait consumption is expected to occur on the first day or two after treatment begins. After several days, inspect the placement and replenish bait at sites where there is evidence of heavy feeding or where there is continued evidence of rodent activity. Normally, the volume of bait consumed will be significantly less with bromethalin baits than with anticoagulant baits. Although one night's feeding will usually provide a lethal dose, maintain bait for at least one week to provide all rodents a chance to feed on the bait. Continue baiting until all signs of feeding have ceased. To discourage reinfestation, limit sources of rodent food, water and harborage as much as possible. If reinfestation does occur, repeat treatment. Where a continuous source of infestation is present, establish permanent bait stations and replenish as needed.

DISPOSAL: Do not reuse empty container. Dispose of unused or spoiled bait in accordance with local requirements. Follow provincial instructions for any required cleaning of the container prior to its disposal. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For more information on the disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean up of spills.

Rodent Disposal: Dispose of dead rodents in garbage or by burying.
STORAGE: Store in a cool, dry place away from other chemicals and food or feed. Store product not in use in original container, in a secure location inaccessible to children and non-target animals.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.



**Water-Resistant • Blocs hydrorésistants
KILLS RATS & MICE • TUE RATS ET SOURIS
Kills Norway Rats, Roof Rats and House Mice
Tue le rat surmulot, le rat noir et la souris commune
INDOOR USE ONLY**

POUR UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT
Rats and mice may consume a lethal dose in a single feeding, with first dead rodents appearing one or two days after bait consumption. Rodents cease feeding after consuming a toxic dose in a single night's feeding. The bait in these blix kills anticoagulant-resistant rats and mice.

Les rats et les souris peuvent en ingérer une dose létale en une seule consommation, et ils commencent à mourir un ou deux jours plus tard. Ils cessent d'en consommer après en avoir ingéré une dose toxique en une seule nuit. Ces blocs d'appât sont efficaces contre les rats et les souris résistants aux anticoagulants.

**REGISTRATION NO.: 27364 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
N° D'HOMOLOGATION: 27364 L01 SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES**

COMMERCIAL

WARNING POISON  **AVERTISSEMENT POISON**

GUARANTEE Brométhaline 0,01% **GARANTEE** Brométhaline 0,01%
* Contains Denatonium Benzoate. * Contient du benzoate de denatonium.
Warning, contains the allergens wheat, soy, leicithin and milk. Avertissement, contient de blé, lecitine de soya, lait.
Contains potassium sorbate at 1.0% Ce produit contient potassium sorbate à 1,0 %, à titre d'agents de conservation, as a preservative.

READ THE LABEL BEFORE USING (see side panels for additional precautionary statements)
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
(pour détails supplémentaires sur la sécurité, voir le panneau latéral)
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Only to be used by certified pest control operators, farmers and persons authorized in government-approved pest control programs.
Usage réservé uniquement aux opérateurs antiparasitaires certifiés, aux exploitants agricoles et aux personnes autorisées dans le cadre d'un programme de lutte antiparasitaire reconnu par le gouvernement.

**NET CONTENTS: 1.92 kg (4.23 lbs)
CONTENU NET: 1.92 kg (4.23 lbs)**

Manufactured By/Fabriqué Par:
3699 Kinsman Blvd.
Madison, WI 53704 U.S.A.
Tel/Tel: 608-241-0202
www.bellabs.com



PRECAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES, DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET DES ANIMAUX SAUVAGES. Toutes les personnes qui manipulent le produit doivent porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures avec chaussettes et des gants résistants aux produits chimiques.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Produit dangereux ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants résistants aux produits chimiques doivent être portés lors de la manipulation de produit et de l'élimination des rongeurs morts, des appâts non consommés et des contenants vides. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de consommer des produits de tabac ou d'utiliser les toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements à l'eau chaude et au savon avant de les réutiliser. TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles «correctives» au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Pour tous les cas d'exposition humaine par ingestion, informer immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire si l'on soupçonne l'empoisonnement d'un animal familier ou d'élevage. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le rodenticide en blocs résistant à l'eau toute-saison Fastrac n'est pas un anticoagulant. En cas d'ingestion, limiter l'absorption en faisant vomir ou en lavant l'estomac. Les symptômes sublétaux, s'il y en a, résultent d'un oedème cérébral et doivent être traités par administration d'un diurétique osmotique et d'un corticoïde.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT: Ce produit est toxique pour les poissons, les oiseaux et les animaux sauvages. Ne pas laisser ce produit se répandre dans les lacs, les rivières, les ruisseaux ou les étangs.

MODE D'EMPLOI : Utiliser des appâts pour lutter contre les rats d'épout (*Rattus norvegicus*), les rats noirs (*Rattus rattus*) et les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur seulement. Ce produit ne convient pas à une utilisation à l'extérieur ou à proximité des puits de ferme, des réservoirs d'eau ou des endroits où il est possible de contaminer les sources d'eau potable.

Transformation des aliments, fabrication de produits alimentaires, stockage des aliments et aires de service alimentaire :

Pour les zones non directement liées à la transformation des aliments : utiliser seulement dans des zones à usage non alimentaire ou dans des endroits où les aliments destinés à une consommation humaine ou animale de même que l'équipement servant à l'emballage et à la manutention ne sont jamais laissés à découvert. Pour les zones où des aliments destinés à une consommation humaine ou animale sont transformés, servis ou entreposés : dans les usines de transformation de la viande ou des aliments (aires de transformation) utiliser seulement si l'usine n'est pas en activité. Ranger ou couvrir tous les aliments, les emballages et les ustensiles avant de placer les appâts dans des points d'appât. Retirer tous les appâts et les carcasses de rongeurs avant la réouverture des installations (y compris les aires d'entreposage et de restauration).

Les utilisateurs doivent enlever immédiatement leurs vêtements si le pesticide s'est infiltré dessous. Laver soigneusement la peau et enlever des vêtements propres.

RESTRICTIONS D'UTILISATION : Les appâts DOIVENT être placés dans des points d'appât inviolables ou dans des emplacements non accessibles par les enfants, les animaux domestiques,

des animaux d'élevage ou les espèces animales non ciblées. NE PAS placer les appâts dans des sites où il existe une possibilité de contamination des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

Le point d'appât (**niveau 3**) contenant un rodenticide et placé à l'intérieur d'un bâtiment, mais hors de la portée des animaux de compagnie ou d'élevage, doit présenter les caractéristiques suivantes: 1) être fabriqué avec un matériau d'une grande solidité (par exemple, métal ou plastique moulé par injection) afin que les enfants ne puissent le détruire; 2) son entrée doit être conçue de façon à ce que les enfants ne puissent atteindre l'appât; 3) sa structure interne doit être telle que l'appât ne puisse pas en tomber; 4) le point d'appât est sécurisé; 4) son panneau d'accès à l'intérieur doit se fermer de façon sécuritaire et doit pouvoir être verrouillé en place (par exemple, au moyen d'une vis ou d'un cadenas); 5) il doit afficher le nom du produit, celui de la matière active, la garantie, le numéro d'homologation et la mention «**AVERTISSEMENT - POISON**» et le symbole composé d'un crâne de squelette et de deux tibias croisés.

Le point d'appât (**niveau 2**) contenant un rodenticide et placé à l'intérieur d'un bâtiment, à la portée des animaux de compagnie ou d'élevage, doit présenter les caractéristiques suivantes, en plus de celles requises pour le point d'appât de niveau 3: 1) être résistant à la destruction par des animaux d'espèces non ciblées; 2) son entrée doit être conçue de façon à ce que les animaux des espèces non ciblées ne puissent atteindre l'appât.

CHOIX DES LIEUX DE TRAITEMENT : Déterminer les lieux où les rats et/ou les souris trouveront et mangeront le plus facilement les appâts. En général, ce sont les endroits situés le long des murs, près des ouvertures et des murs, ou à côté des terrans, dans les coins et les endroits cachés, entre les planchers et les murs, ou à la fois les rongeurs ou leurs traces ont été observés. Enlever le plus possible de nourriture.

APPLICATION :
RAT SURMULOT ET RAT NOIR : Utiliser 2 à 12 morceaux de FASTRAC EN BLOCS RÉSISTANT À L'EAU par emplacement à tous les 6 à 10 m. Ajuster la quantité d'appât utilisée à chaque emplacement selon le niveau de consommation prévu.

SOURIS COMMUNE : Utiliser 1 morceau de FASTRAC EN BLOCS RÉSISTANT À L'EAU par emplacement. Dans les endroits infestés, espacer les emplacements de 2 à 4 m. Là où les souris sont extrêmement actives, on peut utiliser 2 morceaux.

STRATÉGIE D'APPÂTAGE : On peut s'attendre à ce que le niveau de consommation soit à son maximum les deux premiers jours après le début du traitement. Après quelques jours, inspecter les emplacements et les réapprovisionner en appât si il y a des signes de forte consommation ou d'activité continue. Normalement, la quantité d'appât consommée est beaucoup moindre avec la brométhaline qu'avec les anticoagulants. Bien que la consommation d'une dose létale se fasse habituellement en une seule nuit, prévoir de l'appât pendant au moins une semaine pour donner une chance à tous les rats d'en consommer. Poursuivre l'appâtage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signes de consommation. Pour éviter une réinfestation, limiter autant que possible les sources de nourriture, d'eau et de refuge. En cas de réinfestation, traiter de nouveau. En présence d'une source continue de réinfestation, établir des points d'appât permanents et les réapprovisionner au besoin.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter les appâts non utilisés ou avariés conformément aux exigences locales. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant vide inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se débarrasser, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Élimination des rongeurs : Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. Ranger le produit non utilisé dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants et des animaux non ciblés.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.